



SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Arossi GA*



Introdução - **Qualidade de Vida relacionada com a Saúde Oral** tem implicações para a prática clínica, pesquisa odontológica e nas ações públicas de saúde. O índice CPO-D e o IPC não consideram a **percepção subjetiva do indivíduo em relação à saúde bucal** e de como afeta a vida diária

Objetivo - Este trabalho tem objetivo de relacionar saúde bucal com a qualidade de vida, além de identificar se o sexo influencia essa relação.

Método Foi realizado um estudo descritivo transversal. Os participantes estiveram em atendimento na Clínica-Escola de Odontologia da ULBRA (Torres e Canoas). A amostra total constituiu-se de 85 pacientes. Utilizou-se um Questionário de caracterização sócio-econômico-demográfica, com dados sobre sexo, renda, idade, escolaridade. Questionário OHIP – 14; O impacto sobre a qualidade de vida foi mensurado através de soma dos valores ordinais dos 14 itens do questionário. Um odontograma foi utilizado para coletar os dados de dentes cariados, perdidos e obturados. O banco de dados foi exportado para o software SPSS 18.0. Foi realizada uma análise descritiva da população estuda, com médias, desvio-padrão e frequências. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da ULBRA e aprovado sob o Número do Parecer 491.259.

Resultados

Tabela 2: Análise descritiva da Idade, Perda Dental, Perda Anterior e Perda Posterior.

| | Homens | | | | Mulheres | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------|----------|--------|--------|---------------|
| | N | Mínimo | Máximo | Média | N | Mínimo | Máximo | Média |
| Idade | 29 | 12 | 82 | 49,2 (17,44) | 56 | 12 | 71 | 45,77 (16,08) |
| Perda Dental | 29 | 0 | 23 | 8,1 (7,49) | 56 | 0 | 28 | 8,1 (7,6) |
| Perda dental anterior | 29 | 0 | 11 | 2,1 (3,14) | 56 | 0 | 12 | 2,2 (3,3) |
| perda dental posterior | 29 | 0 | 16 | 5,9 (4,99) | 56 | 0 | 16 | 5,9 (4,9) |
| Qualidade de vida | 29 | 0 | 32 | 11,1 (9,2) | 56 | 0 | 43 | 13,80 (10,32) |

Tabela 1. Estatística descritiva de dentes cariados, perdidos e obturados.

| | dentes obturados | dentes cariados | Perda Dental | exo indicada |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Média | 4,15 | 2,06 | 9,02 | ,54 |
| N | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Desvio padrão | 4,38 | 2,96 | 8,19 | 1,85 |
| Mínimo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Máximo | 16,00 | 12,00 | 28,00 | 12,00 |

Conclusão

Conclui-se que saúde bucal e qualidade de vida é um tema interdisciplinar complexo e necessita de uma coleta de dados mais ampla para responder à pergunta da pesquisa.

Referências

- GOTTARDO, Arthur Cesar et al. PERDA DENTAL ANTERIOR INFLUENCIA A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE ORAL. **Revista de Iniciação Científica da ULBRA**, v. 1, n. 13, 2015
- SISCHO, L.; BRODER, H. L. Oral Health-related Quality of Life What, Why, How, and Future Implications. **Journal of dental research**, v. 90, n. 11, p. 1264-1270, 2011.