



PERDA DENTAL ANTERIOR INFLUENCIA A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE ORAL

Webber L; Gottardo AC, Rossi J, Arossi GA

Introdução

Os indicadores sócio-dentais conseguem mensurar o grau em que as doenças bucais interferem no funcionamento normal e desejável do indivíduo, desde os aspectos funcionais (como, por exemplo, comer), os psicológicos (humor, irritação) até os sociais (como freqüentar a escola, trabalhar, desempenhar obrigações familiares).

A maioria dos estudos que mensuram a saúde de indivíduos e populações utilizam como base os indicadores clínicos da doença, e há relativamente poucos estudos de análise sobre a saúde e o bem-estar a partir da autopercepção do indivíduo. O conceito de *Qualidade de vida relacionada a saúde oral* pode se tornar importantíssimo para entender e guiar, não só a prática clínica, pesquisa odontológica e educação dental, mas também o caminho das ações públicas de saúde para a população.

Alguns estudos apresentam resultados onde a perda dentária está diretamente ligada a problemas de mastigação e influência nos aspectos funcionais, físicos, psicológicos e sociais dos indivíduos.

Este trabalho tem objetivo de relacionar a perda dental com a qualidade de vida relacionada a saúde oral, além de identificar se o local da perda no arco dental influencia essa relação.

Métodos

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da ULBRA e aprovado sob o Parecer 491.259. Todos os sujeitos da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foi realizado um estudo descritivo transversal observacional. A amostra foi constituída por pacientes que em atendimento na Clínica-Escola do curso de Odontologia da ULBR Torres e Canoas, no período de fevereiro a dezembro de 2014. A amostra total foi de 85 pacientes.

Para a coleta dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Questionário de caracterização de condições sócio-econômico-demográfica da população (sexo, renda, idade, escolaridade).
- Questionário OHIP – 14: O impacto sobre a qualidade de vida foi mensurado através de soma das respostas ordinais dos 14 itens. As perguntas são distribuídas em sete dimensões (dois itens de cada): "limitações funcionais", "dor", "desconforto psicológico", "incapacidade física", "incapacidade psicológica", "deficiência social" e "incapacidade". Quanto maior o valor, pior a qualidade de vida.
- Perda Dental (Anexo C): um odontograma foi utilizado para identificar o número e local de dentes perdidos, por avaliadores treinados, consistindo de professores e alunos cursando o 8º

Referências

- BENNADI D.; REDDY C.V.K. Oral health related quality of life. *J Int Soc Prev Community Dent.*, v.3, n.1, p. 1-6, 2013
- SISCHO, L.; BRODER, H.L. Oral Health-related Quality of Life - What, Why, How, and Future Implications Oral health. *JDR*, v. 90, n. 11, p. 1264-1270, 2011.
- GERRITSEN, A.E.; ALLEN, P.H.; WITTER, D.J.; BRONKHORST, E.M.; CREUGERS, N.H.J. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. *Health and Quality of Life Outcomes*, 8:126, 2010.
- BATISTA, M.J.; LAWRENCE, H.P.; ROSÁRIO DE SOUSA, M.D.A. L. Impact of tooth loss related to number and position on oral health quality of life among adults. *Health Qual Life Outcomes*, 12: 165, 2014.

semestre do curso de Odontologia.

Foi realizada uma análise descritiva dos dados para caracterização da população estuda, com médias, desvio-padrão e frequências. Para correlacionar as variáveis de perda dental e qualidade de vida foi utilizado o teste de Correlação de Spearman, considerando estatisticamente significativo quando $p \leq 0,05$.

Resultados.





Tabela 1: Média e desvio-padrão das variáveis Idade, Perda Dental, Perda Anterior e Perda Posterior.

	N	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão
Idade	85	12,00	82,00	46,96	16,48
Perda Dental	85	0	28,00	8,07	7,52
nº Perda de dentes anteriores	85	0	12,00	2,14	3,26
nº perda de dentes posteriores	85	0	16,00	5,94	4,92
Qualidade de vida	85	0	43,00	12,91	9,99

	Frequência (n)	Porcentual (%)
Nenhum dente perdido	13	15,3
Apenas um dente perdido	5	5,9
2 a 3 dentes perdidos	11	12,9
4 a 6 dentes perdidos	21	24,7
7 ou mais dentes perdidos	33	38,8
Todos os dentes perdidos	2	2,4
Total	85	100,0

	Qualidade de vida (Sig. (2 extremidades))	Qualidade de vida (correlação de coeficiente)	n
Perda Dental	,114	,173	85
Perda Dental Anterior	,046	,217*	85
Perda Dental Posterior	,217	,135	85



Conclusão

Conclui-se, a partir da metodologia empregada e dos objetivos, que a localização da perda dental no arco influencia significativamente na relação da mesma com a qualidade de vida autorrelatada pelos sujeitos da pesquisa, de forma que a perda dental na região anterior apresenta relação direta com menor qualidade de vida, o que não ocorre quando é desconsiderada essa localização.